NOTICE POUR LE PUBLIC

# NEO-GOLASEPTINE

**DÉNOMINATION**
NEO-GOLASEPTINE SPRAY Solution pour pulvérisation buccale
NEO-GOLASEPTINE Solution pour bain de bouche.

**COMPOSITION**
NEO-GOLASEPTINE SPRAY Solution pour pulvérisation buccale:
Chlorhexidine digluconate 20% 87 mg - Benzéthonium chlorure 4,35 mg.
Maltitol sol. 80/55 - Alcool - Menthol - Polyoxyl 40 Hydro-genated Castor Oil - Arôme pamplemousse - Eau purifiée q.s. ad. 10 g.
NEO-GOLASEPTINE Solution pour bain de bouche:
Chlorhexidine digluconate 20% 50 mg - Benzéthonium chlorure 2,5 mg.
Maltitol sol. 80/55 - Alcool - Menthol - Polyoxyl 40 Hydro-genated Castor Oil - Bleu patenté V (E131) - Arôme pamplemousse - Eau purifiée q.s. ad. 10 ml.

**FORME(S) PHARMACEUTIQUE(S) ET AUTRE(S) PRESENTATION(S)**
NEO-GOLASEPTINE SPRAY Solution pour pulvérisation buccale
Solution pour pulvérisation buccale dosée à 87 mg de chlorhexidine digluconate 20% et 4,35 mg de chlorure de benzéthonium par 10 g et présentée en flacon pulvérisateur de 30 g.
NEO-GOLASEPTINE Solution pour bain de bouche :
Boîte contenant un flacon de 200 ml de solution pour bain de bouche dosé à 50 mg de chlorhexidine digluconate 20% et 2,5 mg de chlorure de benzéthonium par 10 ml.
Voie buccale.

**GROUPE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE**
Médicaments contre les infections de la gorge et du pharynx, contenant deux antiseptiques: la chlorhexidine et le benzéthonium.

**TITULAIRE D'ENREGISTREMENT, FABRICANT**
Titulaire d'enregistrement:
LABORATOIRES SMB S.A.
rue de la Pastorale 26-28
B-1080 BRUXELLES

Fabricant:
SMB TECHNOLOGY S.A.
rue du Parc Industriel 39
B-6900 MARCHE-EN-FAMENNE

**INDIQUÉ DANS**
NEO-GOLASEPTINE est indiqué:
- Dans le traitement symptomatique des pharyngites, aphtes ulcérés, gingivites, candidoses.
- Dans la prévention de ces infections chez les patients immunodéprimés.

- Dans le traitement symptomatique des infections du parodonte (tissu de soutien de la dent).
-Comme agent de désinfection dans les interventions sur le parodonte.
- Dans la prévention et la dissolution de la plaque dentaire.

**CAS OÙ L'USAGE DU MÉDICAMENT DOIT ÊTRE ÉVITÉ**
- Chez les personnes allergiques à la chlorhexidine et/ou au benzéthonium ou à l'un des excipients de la préparation.
- Enfants en dessous de 3 ans.

**PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES**
-Eviter le contact avec les yeux.
- Ne pas avaler.
- Le linge qui a été mis en contact avec NEO-GOLASEPTINE doit d'abord être rincé à fond pour enlever toutes traces et ce n'est qu'après qu'il peut être blanchi avec des produits contenant du chlore. S'il n'est pas rincé à fond, des taches brunes peuvent apparaître, et il faudra, dans ce cas, blanchir avec du perborate.
Comme il est de règle pour la plupart des antiseptiques, NEOGOLASEPTINE ne peut être mis en contact avec le tissu cérébral, le canal médullaire vertébral ou l'oreille moyenne.

**INCOMPATIBILITÉS**
Les principes actifs contenus dans NEO-GOLASEPTINE étant incompatibles avec les savons et les agents tensio-actifs anioniques que l'on peut trouver dans des pâtes dentifrices, il est recommandé de respecter un délai d'au moins une demi-heure entre l'utilisation de préparations contenant ces deux agents et celle de pâte dentifrice.

**INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS OU DES ALIMENTS**: Eviter l'utilisation simultanée ou successive d'autres antiseptiques ou produits à usage local.

**UTILISATION EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT**
Il est conseillé d'utiliser NEO-GOLASEPTINE avec modération et précaution pendant les périodes de grossesse et d'allaitement.

**CONDUITE D'UN VEHICULE ET UTILISATION DE MACHINES**
Aucune contre-indication n'est connue à ce jour.

**COMMENT L'UTILISER ET EN QUELLE QUANTITÉ?**
Solution pour bain de bouche: En gargarisme ou bain de bouche : utiliser 10 ml de solution pour bain de bouche non diluée 2 fois par jour.
Solution pour pulvérisation buccale: 4 pulvérisations 3 à 6 fois par jour.
**Mode d'emploi** : Tenir le flacon pulvérisateur (spray) verticalement, la pompe vers le haut. Orienter l'embout vers le fond de la gorge. Appuyer 4 fois sur la pompe du flacon pulvérisateur. Le flacon pulvérisateur ne contenant pas de gaz propulseur, il faut amorcer la pompe avant la première utilisation en appuyant dessus 3 à 4 fois en dehors de la bouche.
Le flacon pulvérisateur de NEO-GOLASEPTINE SPRAY est muni de 2 embouts permettant ainsi de réduire les risques de contamination en cas d'utilisation par 2 personnes de la même famille.

En cas d'utilisation commune, chaque patient veillera à utiliser son embout et à le rincer soigneusement après chaque utilisation.
Si ce médicament n'apporte pas d'amélioration après 3 à 4 jours, il est conseillé de consulter un médecin.

**VOIE ET MODE D'ADMINISTRATION**
Solution pour pulvérisation buccale (flacon pulvérisateur) et solution pour bain de bouche (flacon) : usage externe.

**MESURES EN CAS D'UTILISATION DE TROP FORTES DOSES**
Dans le cas d'une éventuelle ingestion massive, consultez immédiatement votre médecin.
Il est peu vraisemblable qu'une ingestion accidentelle puisse entraîner des effets généraux, sauf pour d'énormes quantités. On devra tenir compte du risque de lésions hépatiques. Une irritation de la muqueuse gastrique et des intestins peuvent également apparaître.
L'utilisation de trop fortes doses sera traitée symptomatiquement.
Traitement: En cas d'ingestion massive du produit, on peut administrer du charbon de bois.
En cas de doute, veuillez contacter le centre Antipoisons au 070/245.245.

**EFFETS NON DÉSIRÉS**
Troubles gastro-intestinaux:
- fréquent : coloration brunâtre des dents et du dos de la langue, de certains matériaux d'obturation et de prothèse dentaires.
- rare : perturbation du goût, sensation de brûlure de la langue, desquamation de la muqueuse buccale, gonflement des glandes salivaires.
Réactions allergiques cutanées et sous-cutanées:
- fréquent : urticaire, rash, eczéma, nécrose cutanée, choc anaphylactique.
Si vous remarquez des effets non désirés non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

**CONSERVATION**
Les spécialités NEO-GOLASEPTINE ne se conservent pas au-dessus de 25° C.
Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur l'emballage.
Exemple: EX. 09-2007; expiration le 1er septembre 2007.
A conserver hors de portée des enfants.

**DATE DE DERNIERE RÉVISION DE LA NOTICE:**
06 octobre 2003.